

BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL

Por favor siga cuidadosamente las siguientes instrucciones y recuerde que el éxito del examen depende de su colaboración.

- Presentar historia clínica y resultados de ayudas diagnósticas: ecografías, resonancias, entre otros.
- Presentar resultado de antígeno prostático y urocultivo reciente (vigencia 15 días).
- Presentar resultados de pruebas de coagulación recientes: TP, TPT, recuento de plaquetas (vigencia de 15 días)
- Hemograma tipo IV, creatinina (vigencia de 15 días)
- Asistir con un acompañante.
- Traer jugo natural en agua, galletas de soda o fruta.
- Advertir al personal médico y de enfermería si está tomando algún medicamento.

Dos días antes del estudio:

- Inicie Ciprofluoxacina tabletas de 500 mg cada 12 horas y continúelas hasta acabarlas en 5 días. Cantidad total: 10 tabletas.
- Inicie Metrodidazol tabletas de 500 mg cada 8 horas y continúelas hasta acabarlas en 5 días. Cantidad total: 15 tabletas

Un día antes del estudio:

- Tomar abundante líquido y no consumir lácteos ni gaseosas.
- Consumir dieta líquida.
- Entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m., colocarse vía anal un enema de marca Travad de 150 cc con aplicador rectal. Dicho enema deber ser introducido a través del ano, contenerlo sin dejarlo salir durante 5 minutos y después evacuarlo.

El día del estudio:

- Entre las 5:00 a.m. y las 6:00 a.m., colocarse vía anal un enema de marca Travad de 150 cc con aplicador rectal. Dicho enema deber ser introducido a través del ano, contenerlo sin dejarlo salir durante 5 minutos y después evacuarlo.
- Desayunar liviano (agua panela con galletas de soda, no gaseosas no lácteos).
- Debe suspender los siguientes medicamentos si los usa: Aspirina, Asawin, Aspirineta, Ibuprofeno, Diclofenaco o anticoagulantes 10 días antes del examen.
- Debe suspender todos los medicamentos homeopáticos como Ginkgo Biloba, ácidos grasos, Omega 3, Vitamina E o té verde. Si está tomando medicamentos de control para hipertensión arterial, epilepsia, diabetes u otras enfermedades que no requieren anticoagulación, se debe seguir tomando con agua incluso el día del examen.

Después del estudio:

- Se recomienda que solo realice actividades ligeras durante 24 a 48 horas luego de la biopsia de próstata.
- Durante las primeras 24 horas evite hacer uso de transporte público o motocicleta.
- Probablemente deba tomar un antibiótico durante algunos días. Podría también: Sentir dolor y tener un pequeño sangrado por el recto. Tener sangre en la orina o en las heces durante algunos días. Notar que el semen tiene un tinte de color rojo o rojizo causado por una pequeña cantidad de sangre en tu semen. Esto puede durar unos días.
- Comuníquese con tu médico si tiene los siguientes síntomas: fiebre, dificultad para orinar, sangrado prolongado e intenso o dolor que aumenta.