

## BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL

Por favor siga cuidadosamente las siguientes instrucciones y recuerde que el éxito del examen depende de su colaboración.

- Presentar historia clínica y resultados de ayudas diagnósticas: ecografías, resonancias, entre otros.
- Presentar resultado de antígeno prostático y urocultivo reciente (vigencia 10 días).
- Presentar resultados de pruebas de coagulación recientes: TP, TPT, recuento de plaquetas (vigencia de 10 días)
- Hemograma tipo IV, creatinina (vigencia de 10 días)
- Asistir con un acompañante.
- Traer jugo natural en agua, galletas de soda o fruta.
- Advertir al personal médico y de enfermería si está tomando algún medicamento.

### **Dos días antes del estudio:**

- Inicie Ciprofluoxacina tabletas de 500 mg cada 12 horas y continúelas hasta acabarlas en 5 días. Cantidad total: 10 tabletas.
- Inicie Metrodidazol tabletas de 500 mg cada 8 horas y continúelas hasta acabarlas en 5 días. Cantidad total: 15 tabletas

### **Un día antes del estudio:**

- Tomar abundante líquido y no consumir lácteos ni gaseosas.
- Consumir dieta líquida.
- Entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m., colocarse vía anal un enema de marca Travad de 150 cc con aplicador rectal. Dicho enema deber ser introducido a través del ano, contenerlo sin dejarlo salir durante 5 minutos y después evacuarlo.

### **El día del estudio:**

- Entre las 5:00 a.m. y las 6:00 a.m., colocarse vía anal un enema de marca Travad de 133 cc con aplicador rectal. Dicho enema deber ser introducido a través del ano, contenerlo sin dejarlo salir durante 5 minutos y después evacuarlo.
- Desayunar liviano (agua panela con galletas de soda, no gaseosas no lácteos).
- Debe suspender los siguientes medicamentos si los usa: Aspirina, Asawin, Aspirineta, Ibuprofeno, Diclofenaco o anticoagulantes 10 días antes del examen.
- Debe suspender todos los medicamentos homeopáticos como Ginkgo Biloba, ácidos grasos, Omega 3, Vitamina E o té verde. Si está tomando medicamentos de control para hipertensión arterial, epilepsia, diabetes u otras enfermedades que no requieren anticoagulación, se debe seguir tomando con agua incluso el día del examen.

### **Después del estudio:**

- Se recomienda que solo realice actividades ligeras durante 24 a 48 horas luego de la biopsia de próstata.
- Durante las primeras 24 horas evite hacer uso de transporte público o motocicleta.
- Probablemente deba tomar un antibiótico durante algunos días. Podría también: Sentir dolor y tener un pequeño sangrado por el recto. Tener sangre en la orina o en las heces durante algunos días. Notar que el semen tiene un tinte de color rojo o rojizo causado por una pequeña cantidad de sangre en tu semen. Esto puede durar unos días.
- Comuníquese con tu médico si tiene los siguientes síntomas: fiebre, dificultad para orinar, sangrado prolongado e intenso o dolor que aumenta.

### Observaciones Generales:

- Paciente con urocultivo positivo **NO SE PROGRAMA**
- Paciente portador de sonda generalmente debe tener urocultivo positivo debe tener aval del infectólogo o del urólogo para poder realizar el procedimiento.
- El médico tratante le debe enviar 3 días antes al paciente antibiótico endovenoso para reducir la posibilidad de infección.
- En caso que al paciente cuando asista al procedimiento no le hayan realizado la aplicación endovenosa del antibiótico, el área asistencial de Unicancer está en capacidad ese mismo día de colocar el medicamento endovenoso. El medicamento lo debe traerlo el paciente.

para orinar, sangrado prolongado e intenso o dolor que aumenta.